



8.5 Hemishoferbach (S05, GEWISS-Nr. 665)


A Matrix-Gruppe B, Faktor Vielfalt x 2.16 *



B Matrix-Gruppe B, Faktor Abundanz x 7.25 *



C Gruppe B: naturnaher Bach + kleiner Biberteich



D



Koordinaten

2°7'05"737 / 1°28'22"320

Kanton, Gemeinde

Schaffhausen (SH), Hemishofen

Matrix-Gruppe

B

Ökomorphologie Bach

naturnah

Biberteich Grösse

klein bis mittel

Lebensraumeinheit

Wald

Aufnahmejahr

2021

Aufnahmen

ohne Damm



Legende

A= Effekt Artenvielfalt in den vier Gruppen der Meta-Analyse

B= Effekt Abundanz in den vier Gruppen der Meta-Analyse

C= Effekt Diversität in den vier Gruppen über alle Standorte und Strecken


D= Foto Studiendamm

E= Drohnenbild benetzter Fläche («Vernässung») Revierstrecke

F= Effekt Wasserspiegelbreite und Abflusstiefe Revierstrecke

G= Drohnenbild benetzter Fläche («Vernässung») Kontrollstrecke

H= Effekt Wasserspiegelbreite und Abflusstiefe Kontrollstrecke




8.2 Strecken: Revierstrecke mit Biberteich (links) + Kontrollstrecke ohne Biberteich (rechts)



Definition Gruppe B: Dammreviere in natürlichen oder wenig beeinträchtigten Gewässern. Aufgrund der eher steilen Geländemorphologie begrenzte seitliche Ausprägung des Biberteiches. Eher kleine Biberteiche werden aufgestaut. Biberdämme können auch längere Zeit bestehen bleiben. Häufig finden sich in dieser Gruppe **Dammkaskaden**.

Besonderheit Hemishoferbach: Dammaktivität seit **2007**. Alter bei Aufnahme **14** Jahre.

8.7 Gilebach (S07, GEWISS-Nr. 590720)



Koordinaten

Kanton, Gemeinde

Matrix-Gruppe

Ökomorphologie Bach

Biberteich Grösse

Lebensraumeinheit

Aufnahmejahr

Aufnahmen

2`699`176 / 1`272`219

Thurgau (TG), Neunforn

B


naturnah

klein bis mittel

Wald

2021

mit Damm



Legende

A= Effekt Artenvielfalt in den vier Gruppen der Meta-Analyse

B= Effekt Abundanz in den vier Gruppen der Meta-Analyse

C= Effekt Diversität in den vier Gruppen über alle Standorte und Strecken

D= Foto Studiendamm

E= Drohnenbild benetzter Fläche («Vernässung») Revierstrecke

F= Effekt Wasserspiegelbreite und Abflusstiefe Revierstrecke

G= Drohnenbild benetzter Fläche («Vernässung») Kontrollstrecke

H= Effekt Wasserspiegelbreite und Abflusstiefe Kontrollstrecke


8.7 Strecken: Revierstrecke mit Biberteich (links) + Kontrollstrecke ohne Biberteich (rechts)



Definition Gruppe B: Dammreviere in natürlichen oder wenig beeinträchtigten Gewässern. Aufgrund der eher steilen Geländemorphologie begrenzte seitliche Ausprägung des Biberteiches. Eher kleine Biberteiche werden aufgestaut. Biberdämme können auch längere Zeit bestehen bleiben. Häufig finden sich in dieser Gruppe **Dammkaskaden**.

Besonderheit Gilebach: Dammaktivität seit **2013**. Alter bei Aufnahme **8** Jahre.

8.11 Gäbelbach (S11, GEWISS-Nr. 1421)



Koordinaten

2°59'27.34" / 1°19'45.3"

Kanton, Gemeinde

Bern (BE), Bern

Matrix-Gruppe

B

Ökomorphologie Bach

naturnah

Biberteich Grösse

klein bis mittel

Lebensraumeinheit


Offenland

Aufnahmejahr

2022

Aufnahmen

ohne Damm



Legende

A= Effekt Artenvielfalt in den vier Gruppen der Meta-Analyse

B= Effekt Abundanz in den vier Gruppen der Meta-Analyse

C= Effekt Diversität in den vier Gruppen über alle Standorte und Strecken

D= Foto Studiendamm

E= Drohnenbild benetzter Fläche («Vernässung») Revierstrecke

F= Effekt Wasserspiegelbreite und Abflusstiefe Revierstrecke

G= Drohnenbild benetzter Fläche («Vernässung») Kontrollstrecke

H= Effekt Wasserspiegelbreite und Abflusstiefe Kontrollstrecke


8.11 Strecken: Revierstrecke mit Biberteich (links) + Kontrollstrecke ohne Biberteich (rechts)



Definition Gruppe B: Dammreviere in natürlichen oder wenig beeinträchtigten Gewässern. Aufgrund der eher steilen Geländemorphologie begrenzte seitliche Ausprägung des Biberteiches. Eher kleine Biberteiche werden aufgestaut. Biberdämme können auch längere Zeit bestehen bleiben. Häufig finden sich in dieser Gruppe **Dammkaskaden**.

Besonderheit Gäbelbach: Dammaktivität seit **2017**. Alter bei Aufnahme **5** Jahre.

8.15 Coruz (S15, GEWISS-Nr. 3222)



Koordinaten

Kanton, Gemeinde

Matrix-Gruppe

Ökomorphologie Bach

Biberteich Grösse

Lebensraumeinheit

Aufnahmejahr

Aufnahmen

2°54'217 / 1°16'523

Waadt (VD), Montilliez

B


naturnah

klein bis mittel

Wald

2022

mit Damm



Legende

A= Effekt Artenvielfalt in den vier Gruppen der Meta-Analyse

B= Effekt Abundanz in den vier Gruppen der Meta-Analyse

C= Effekt Diversität in den vier Gruppen über alle Standorte und Strecken

D= Foto Studiendamm

E= Drohnenbild benetzter Fläche («Vernässung») Revierstrecke

F= Effekt Wasserspiegelbreite und Abflusstiefe Revierstrecke

G= Drohnenbild benetzter Fläche («Vernässung») Kontrollstrecke

H= Effekt Wasserspiegelbreite und Abflusstiefe Kontrollstrecke

8.16 Strecken: Revierstrecke mit Biberteich (links) + Kontrollstrecke ohne Biberteich (rechts)



Definition Gruppe B: Dammreviere in natürlichen oder wenig beeinträchtigten Gewässern. Aufgrund der eher steilen Geländemorphologie begrenzte seitliche Ausprägung des Biberteiches. Eher kleine Biberteiche werden aufgestaut. Biberdämme können auch längere Zeit bestehen bleiben. Häufig finden sich in dieser Gruppe **Dammkaskaden**.

Besonderheit Coruz: Dammaktivität seit **2011**. Alter bei Aufnahme **11** Jahre.