


8.2 Elliker-/Schwarzbach (S02, GEWISS-Nr. 640)



Koordinaten

Kanton, Gemeinde

Matrix-Gruppe

Ökomorphologie Bach

Biberteich Grösse

Lebensraumeinheit

Aufnahmejahr

Aufnahmen

2°7'03"301 / 1°26'8"191

Zürich (ZH), Ellikon an der Thur

A

beeinträchtigt

klein bis mittel

Offenland

2021

mit Damm



Legende

A= Effekt Artenvielfalt in den vier Gruppen der Meta-Analyse

B= Effekt Abundanz in den vier Gruppen der Meta-Analyse

C= Effekt Diversität in den vier Gruppen über alle Standorte und Strecken

D= Foto Studiendamm

E= Drohnenbild benetzter Fläche («Vernässung») Revierstrecke

F= Effekt Wasserspiegelbreite und Abflusstiefe Revierstrecke

G= Drohnenbild benetzter Fläche («Vernässung») Kontrollstrecke

H= Effekt Wasserspiegelbreite und Abflusstiefe Kontrollstrecke


8.2 Strecken: Revierstrecke mit Biberteich (links) + Kontrollstrecke ohne Biberteich (rechts)



Definition Gruppe A: Dammreviere in eingetieften Gewässern, Aufgrund der beeinträchtigten Bachökomorphologie (vielfach hart verbaut) begrenzte seitliche Ausprägung. Eher kleine Biberteiche werden aufgestaut. Biberdämme bleiben meist nur kurze Zeit bestehen. Häufig finden sich in dieser Gruppe **Einzeldämme**.

Besonderheit Ellikerbach: Dammaktivität seit **2016**. Alter bei Aufnahme **5** Jahre.

8.3 Tegelbach (S03, GEWISS-Nr. 2060)



Kanton, Gemeinde

Ökomorphologie Bach

Lebensraumeinheit

Aufnahmen

Thurgau (TG), Gachnang

beeinträchtigt

Offenland

ohne Damm



Legende

A= Effekt Artenvielfalt in den vier Gruppen der Meta-Analyse

B= Effekt Abundanz in den vier Gruppen der Meta-Analyse

C= Effekt Diversität in den vier Gruppen über alle Standorte und Strecken

D= Foto Studiendamm

E= Drohnenbild benetzter Fläche («Vernässung») Revierstrecke

F= Effekt Wasserspiegelbreite und Abflusstiefe Revierstrecke

G=Drohnenbild benetzter Fläche («Vernässung») Kontrollstrecke

H= Effekt Wasserspiegelbreite und Abflusstiefe Kontrollstrecke


8.3 Strecken: Revierstrecke mit Biberteich (links) + Kontrollstrecke ohne Biberteich (rechts)



Definition Gruppe A: Dammreviere in eingetieften Gewässern, Aufgrund der beeinträchtigten Bachökomorphologie (vielfach hart verbaut) begrenzte seitliche Ausprägung. Eher kleine Biberteiche werden aufgestaut. Biberdämme bleiben meist nur kurze Zeit bestehen. Häufig finden sich in dieser Gruppe **Einzeldämme**.

Besonderheit Tegelbach: Dammaktivität seit **2009**. Alter bei Aufnahme **12** Jahre.

8.9 Chriesbach (S09, GEWISS-Nr. 2291)



Koordinaten

Kanton, Gemeinde

Matrix-Gruppe

Ökomorphologie Bach

Biberteich Grösse

Lebensraumeinheit

Aufnahmejahr

Aufnahmen

2°689'796 / 1°251'524

Zürich (ZH), Dübendorf/Dietlikon

A


beeinträchtigt

klein bis mittel

Offenland

2022

mit Damm



Legende

A= Effekt Artenvielfalt in den vier Gruppen der Meta-Analyse

B= Effekt Abundanz in den vier Gruppen der Meta-Analyse

C= Effekt Diversität in den vier Gruppen über alle Standorte und Strecken

D= Foto Studiendamm

E= Drohnenbild benetzter Fläche («Vernässung») Revierstrecke

F= Effekt Wasserspiegelbreite und Abflusstiefe Revierstrecke

G= Drohnenbild benetzter Fläche («Vernässung») Kontrollstrecke

H= Effekt Wasserspiegelbreite und Abflusstiefe Kontrollstrecke


8.9 Strecken: Revierstrecke mit Biberteich (links) + Kontrollstrecke ohne Biberteich (rechts)



Definition Gruppe A: Dammreviere in eingetieften Gewässern, Aufgrund der beeinträchtigten Bachökomorphologie (vielfach hart verbaut) begrenzte seitliche Ausprägung. Eher kleine Biberteiche werden aufgestaut. Biberdämme bleiben meist nur kurze Zeit bestehen. Häufig finden sich in dieser Gruppe **Einzeldämme**.

Besonderheit Chriesbach: Dammaktivität seit **2018**. Alter bei Aufnahme **4** Jahre.

8.10 Leugene (S10, GEWISS-Nr. 1399)



Koordinaten

Kanton, Gemeinde

Matrix-Gruppe

Ökomorphologie Bach

Biberteich Grösse

Lebensraumeinheit

Aufnahmejahr

Aufnahmen

2°59'12.55" / 1°22'42.54"

Bern (BE), Pieterlen

A


beeinträchtigt

klein bis mittel

Offenland

2022

mit Damm



Legende

A= Effekt Artenvielfalt in den vier Gruppen der Meta-Analyse

B= Effekt Abundanz in den vier Gruppen der Meta-Analyse

C= Effekt Diversität in den vier Gruppen über alle Standorte und Strecken

D= Foto Studiendamm

E= Drohnenbild benetzter Fläche («Vernässung») Revierstrecke

F= Effekt Wasserspiegelbreite und Abflusstiefe Revierstrecke

G= Drohnenbild benetzter Fläche («Vernässung») Kontrollstrecke

H= Effekt Wasserspiegelbreite und Abflusstiefe Kontrollstrecke

8.10 Strecken: Revierstrecke mit Biberteich (links) + Kontrollstrecke ohne Biberteich (rechts)



Definition Gruppe A: Dammreviere in eingetieften Gewässern, Aufgrund der beeinträchtigten Bachökomorphologie (vielfach hart verbaut) begrenzte seitliche Ausprägung. Eher kleine Biberteiche werden aufgestaut. Biberdämme bleiben meist nur kurze Zeit bestehen. Häufig finden sich in dieser Gruppe **Einzeldämme**.

Besonderheit Leugene: Dammaktivität seit **2016**. Alter bei Aufnahme **5** Jahre.