


Abramis brama (Linnaeus 1758)

Brème franche (ou commune)



ABRAMIS BRAMA
Presence in 5x5 km
1990< 1990



Caractères

La brème franche se caractérise par son corps haut et comprimé, sa nageoire anale possédant 23-31 rayons rameux (mous) et ses 51-60 écailles sur la ligne latérale. Le diamètre de l'œil est inférieur à la distance du bord de l'œil au bout du museau. Généralement sa dorsale comporte 9 rayons rameux et le lobe inférieur de sa nageoire caudale est plus long.

Taille : 20-60cm Longévité : 10 à 20 ans

Distribution

La brème franche est répandue à travers toute l'Europe à partir du nord des Pyrénées et des Alpes. Elle est absente d'Europe méridionale ainsi que du nord-ouest de la Scandinavie. Des introductions ponctuelles sont signalées au sud des Alpes. En Suisse, elle est recensée dans les deux bassins versants principaux (Rhin et Rhône) et depuis peu dans celui du Pô. On la rencontre principalement dans les grands cours d'eau du Plateau et les lacs, dont le Léman dans lequel elle a été introduite en 1955. L'altitude maximale d'observation est de 1255m.

Biologie

La croissance de la brème est très variable ce qui crée de nombreuses variations morphologiques chez cette espèce. C'est un poisson robuste et résistant dont la taille dépend directement de l'apport nutritif du milieu. Son comportement est grégaire et les individus paressent en bancs le long des rives ou des cours d'eau répétant le même circuit. Son nom est associé à la partie inférieure des cours d'eau, la zone à brèmes. Son régime alimentaire est omnivore et elle se nourrit tête en bas et gobe les organismes benthiques au moyen de sa bouche protractile. Le frai a lieu au printemps dans des zones de faibles profondeurs où la parade nuptiale agitée conduit à la ponte de dizaines de milliers d'ovules qui adhèrent à la végétation.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Non menacé / Least concern