


Alburnoides bipunctatus (Bloch 1782)

Spirlin (ou Ablette de rivière)



Caractères

Copyright CSCF, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

Le spirlin se caractérise par sa ligne latérale très incurvée vers le bas et, bordée de deux rangs de points noirs. Il est toujours de petite taille. Il possède entre 47 et 51 écailles le long de sa ligne latérale. Sa bouche est terminale, la base de ses nageoires est souvent orangée et il possède 12-18 rayons rameux (mous) à la nageoire anale.

Taille : 9-15cm

Longévité : 6 à 10 ans

Distribution

La répartition du spirlin est principalement Eurasiatique, avec comme bassin principal celui du Danube. Il est absent de la péninsule Ibérique, du sud des Alpes, de la Scandinavie, de la Grande Bretagne et de l'Irlande. En Suisse, il est présent dans les bassins du Rhin et du Rhône. On peut l'observer dans les grands cours d'eau et dans quelques lacs du nord des Alpes. Sa limite de répartition altitudinale est de 700m mais suite à des introductions dans des lacs de montagne, il est signalé jusqu'à 1770m.

Biologie

Le spirlin est un petit poisson grégaire qui affectionne les rivières à courants vifs et bien oxygénées. On le trouvera souvent dans les zones à ombres ou à barbeaux et occasionnellement dans la zone littorale des lacs. Le frai a lieu entre mai et juillet, la femelle dépose de gros ovules adhérents sur des graviers peu profonds. La ponte peut être fractionnée en plusieurs étapes sur environ une quinzaine de jours. Le spirlin se nourrit de petits organismes benthiques, de plancton et d'insectes aériens.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Menacé / Not evaluated