


Barbus barbus (Linnaeus 1758)

Barbeau commun (ou fluviatile)



BARBUS BARBUS
Presence in 5x5 km
1990< ■ ■>1990



Caractères

Copyright CSCF, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

Le barbeau se caractérise par le bord postérieur du long rayon de sa nageoire dorsale qui est ossifié et dentelé. Par ses quatre barbillons à la lèvre supérieure et par sa nageoire anale qui une fois rabattue n'atteint pas la naissance de la caudale. Il possède entre 53 et 63 écailles le long de la ligne latérale. Sa lèvre inférieure est épaissie et il possède 5-6 rayons rameux (mous) à la nageoire anale.

Taille : 30-100cm Longévité : 6 à 15 ans

Distribution

Le barbeau a une aire de répartition naturelle qui est limitée par l'Atlantique, les Alpes et la mer Baltique. Elle comprend aussi le bassin du Dniepr à l'est. Il est absent d'Irlande, d'Ecosse, du Danemark et de la Scandinavie. En Suisse, le barbeau n'est présent qu'au nord des Alpes et principalement dans les grandes rivières du Plateau. Il est recensé jusqu'à 905m d'altitude.

Biologie

Le barbeau est un poisson benthique qui se tient près du fond dans des zones sableuses ou graveleuse propres. Il est grégaire et principalement actif de nuit ou au crépuscule. Le barbeau donne son nom à la zone à barbeaux qui lui est caractéristique. Il s'agit des zones de grands cours d'eau à faible pente dont le courant est modéré à fort. Il se nourrit d'organismes benthiques et parfois de végétaux. Le frai a lieu entre mai et juillet où les géniteurs remontent les rivières en grands bancs. La femelle dépose ses ovules sur le fond où ils se développeront jusqu'à éclosion. Les jeunes restent abrités dans les interstices du fond environ une dizaine de jours.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Potentiellement menacé / Least concern