


Barbus caninus (Bonaparte 1839)

Barbeau canin



Copyright CSCF, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

Caractères

Le barbeau canin se caractérise par le bord postérieur du long rayon de sa nageoire dorsale qui est lisse, par ses quatre barbillons à la lèvre supérieure et par sa nageoire anale qui une fois rabattue atteint la naissance de la caudale. Il possède entre 36 et 55 écailles le long de la ligne latérale, des taches marbrées sur les flancs et les nageoires et provient du sud des Alpes.

Taille : 15-40cm Longévité : 3 à 5 ans

Distribution

Le barbeau canin est une espèce récemment distinguée grâce aux systématiques récentes et aux analyses génétiques. Il est présent au Tessin et au nord de l'Italie et se distingue de celui observé au sud de la France ou au nord-est de l'Espagne (*Barbus meridionalis*). En Suisse, le barbeau canin n'est présent qu'au sud des Alpes et principalement dans les grands lacs et les rivières de plaine. Il est recensé jusqu'à 416m d'altitude.

Biologie

Le barbeau canin est un poisson benthique qui se tient près du fond dans des zones sableuse ou graveleuse propres. Il est grégaire et principalement actif de nuit ou au crépuscule. Le barbeau canin peut être observé plus en amont que le barbeau commun, jusque dans la zone à ombres. Il se nourrit d'organismes benthiques et parfois de végétaux. Ses exigences écologiques sont peu connues mais il semble apprécier les eaux fraîches et bien oxygénées.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Fortement menacé / Endangered