


Barbus plebejus (Valenciennes 1842)

Barbeau italien



BARBUS PLEBEJUS
Presence in 5x5 km
1990< 1990>



Copyright CSCF, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

Caractères

Le barbeau italien se caractérise par le bord postérieur du long rayon de sa nageoire dorsale qui est dentelé, par ses quatre barbillons à la lèvre supérieure et par sa nageoire anale qui une fois rabattue n'atteint pas la naissance de la caudale. On remarquera que son corps et ses nageoires sont couverts de petites taches foncées. Il possède entre 58 et 80 écailles le long de la ligne latérale et provient du sud des Alpes.

Taille : 25-35cm Longévité : 4 à 7 ans

Distribution

Le barbeau italien est une espèce, comme son nom l'indique, présente en Italie et au Tessin. On en trouve également le long du littoral adriatique jusqu'en Dalmatie. En Suisse, il n'a été signalé qu'au Tessin dans les grands lacs et les cours d'eau de plaine. Il a été exceptionnellement recensé jusqu'à 950m d'altitude.

Biologie

Le barbeau italien est un poisson benthique qui se tient près du fond dans des zones sableuses ou graveleuses propres. Il est grégaire et principalement actif de nuit ou au crépuscule. Le barbeau italien peut être observé plus en amont que le barbeau commun, jusque dans la zone à ombres. Il se nourrit d'organismes benthiques et parfois de végétaux. Le frai a lieu entre mai et juillet dans des zones peu profondes où la femelle dépose ses ovules sur divers substrats.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Menacé / Least concern