


Blicca bjoerkna (Linnaeus 1758)

Brème bordelière



Caractères

Copyright CSCF, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

La brème bordelière se caractérise par son corps haut et comprimé, sa nageoire anale possédant 19-24 rayons rameux (mous) et ses 43-55 écailles sur la ligne latérale. Le diamètre de l'œil est égal à la distance du bord de l'œil au bout du museau. Ses nageoires sont rougeâtres ou orangées à la base. Généralement sa nageoire dorsale possède 8 rayons rameux.

Taille : 25-35cm Longévité : 10 à 20 ans

Distribution

La brème bordelière est répandue à travers toute l'Europe du nord des Pyrénées et des Alpes. Elle est absente d'Europe méridionale et septentrionale ainsi que du nord de l'Angleterre, de la Scandinavie, de l'Ecosse et de l'Irlande. En Suisse, elle n'est recensée que dans le bassin du Rhin et principalement dans les lacs de plaine. Elle est recensée jusqu'à 890m d'altitude dans des lacs de montagne où elle a été introduite.

Biologie

La brème bordelière ressemble à la brème commune mais est plus petite. De plus, elle est démunie de bouche protractile et son œil est plus gros. Son comportement est grégaire et les individus paressent en bancs le long des rives ou des cours d'eau répétant le même circuit. Son régime alimentaire est omnivore. Elle se nourrit des organismes benthiques ou de plancton. Le frai a lieu au printemps dans des zones de faibles profondeurs et bien végétalisées où la parade nuptiale agitée conduit à la ponte de dizaines de milliers d'ovules qui adhèrent à la végétation.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Non menacé / Least concern