


## *Carassius carassius* (Linnaeus 1758)

### Carassin



Copyright CSCF, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

### Caractères

Le carassin se caractérise par sa nageoire dorsale qui a une base nettement plus longue que celle de son anale, par le sommet de sa nageoire dorsale qui est plutôt convexe et par ses 6-7 rayons rameux (mous) à la nageoire anale. Il possède entre 31 et 36 écailles sur la ligne latérale.

Taille : 20-35cm      Longévité : 4 à 7 ans

### Distribution

Le carassin se trouve dans toute l'Europe à l'exception de l'Irlande, du nord de la Scandinavie, de l'Angleterre et des côtes de l'Adriatique et de la Méditerranée (excepté le sud-est de la péninsule Ibérique). En Suisse, il a été recensé dans les deux bassins principaux (Rhin et Rhône) dans les lacs et dans les cours d'eau lents du Plateau. Il a été observé jusqu'à 994m d'altitude et exceptionnellement dans le bassin du Pô (Scairolo, Tessin, 1997).

### Biologie

Le carassin est un poisson très résistant, qui supporte des conditions extrêmes telles que le manque d'oxygène ou le gel. Il est assez grégaire et sédentaire partiel. Son régime alimentaire peut être considéré comme omnivore. Il fouille la vase de sa bouche suceuse et protractile. Le frai a lieu au printemps dans des zones calmes à faible profondeur. En plusieurs vagues, la femelle dépose une grande quantité d'ovules qui adhèrent à la végétation, lesquels seront fécondés par le mâle qui porte des tubercules nuptiaux.

### Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Néozone / Least concern