


Leuciscus leuciscus (Linnaeus 1758)

Vandoise



Caractères

Copyright CSCF, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

La vandoise se caractérise par le sommet de sa nageoire anale qui est concave, sa section de corps est arrondie, son iris jaunâtre présentant de petites taches sombres et son triangle osseux marqué en arrière de l'opercule. Sa bouche est infère ou terminale et elle possède entre 8 et 9 rayons rameux (mous) à la nageoire anale. Elle a entre 41 et 52 écailles sur sa ligne latérale et ses écailles sont souvent bordées de noir.

Taille : 15-20cm Longévité : 10 à 15 ans

Distribution

La vandoise est une espèce largement répandue qui colonise les régions centrales de l'Eurasie. Deux sous-espèces sont décrites dans le bassin de la Garonne et au sud de la France. Elle est absente d'Ecosse et d'Extrême-Orient. En Suisse, elle est présente dans le bassin du Rhin et celui du Rhône (Doubs) principalement dans les grands lacs et les cours d'eau du Plateau. Elle est observée jusqu'à 1592m d'altitude où elle a certainement été introduite.

Biologie

La vandoise est un poisson rhéophile (affectionnant les eaux courantes) mais on peut aussi l'observer dans des lacs. C'est l'un des cyprinidés les plus performants pour la nage. Les vandoises se tiennent généralement en groupes nombreux et se nourrissent de divers petits organismes aquatiques et occasionnellement de débris végétaux. Le frai a lieu au printemps et les individus migrent en amont pour rejoindre les bancs de gravier des cours d'eau dans lesquels les femelles déposeront leurs œufs.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Non menacé / Least concern