


Phoxinus phoxinus (Linnaeus 1758)

Vairon



Copyright CSCF, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

Caractères

Le vairon se caractérise par sa petite taille, son museau arrondi, son corps cylindrique et ses minuscules écailles canaliculées souvent interrompues. Sa ligne latérale peut être incomplète et est composée d'au moins 70 écailles. Ses nageoires sont arrondies et il possède 6-8 rayons rameux (mous) à la nageoire anale.

Taille : 10-14cm Longévité : 3 à 6 ans

Distribution

Le vairon est l'un des poissons avec la plus large distribution en Europe. On le trouve du nord des Pyrénées jusqu'au bassin de l'Amour. Il est absent d'Irlande, de Norvège, du nord de l'Ecosse, du sud des Balkans et du centre et sud de l'Italie. En Suisse, il est présent dans toutes les régions et ce jusqu'à 2823m d'altitude.

Biologie

Le vairon est un poisson grégaire qui colonise les ruisseaux clairs et oxygénés des zones à truites mais aussi les lacs et les plans d'eau. Son régime alimentaire est principalement constitué de petits crustacés et d'insectes volants. Le frai a lieu entre avril et août sur fond graveleux en eau peu profonde où les femelles déposent leurs ovules adhérents. Les mâles arborent alors des tubercules nuptiaux et se colorent vivement. Son intérêt halieutique indirect, via son utilisation comme appât, en a profité à sa dispersion.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Potentiellement menacé / Least concern