


Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel 1846)

Pseudorasbora



Caractères

Copyright CSCF, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

Le pseudorasbora se caractérise par sa bande sombre sur les flancs et sa fente buccale presque verticale quand sa bouche est fermée. Sa tête est conique, sa bouche supère, il a 7-8 rayons rameux (mous) à la nageoire dorsale et 6-7 à sa nageoire anale. Son corps est allongé et il possède un croissant foncé sur le bord postérieur de ses écailles. Sa ligne latérale est composée de 33-38 écailles.

Taille : 10-15cm Longévité : 2 à 5 ans

Distribution

Le pseudorasbora est originaire d'Asie du sud-est. Il aurait accidentellement été importé en Roumanie en 1961 lors de livraisons de carpes herbivores. Dès lors, il colonise naturellement l'Europe via le bassin du Danube. En Suisse, il a été recensé dans un étang du bassin du Rhône proche de Bonfol, ainsi que dans deux sites du bassin du Rhin. L'altitude maximale de recensement est de 440m.

Biologie

Le pseudorasbora affectionne les milieux lenticques ainsi que les zones à courant faible des cours d'eau. Il se nourrit majoritairement de zooplancton mais mange parfois les juvéniles d'autres espèces. Le frai a lieu au printemps où le mâle arbore des tubercules nuptiaux. La femelle dépose une énorme quantité d'œufs directement sur le substrat qui seront fécondés instantanément par le mâle.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Néozone / Not evaluated