


Rhodeus amarus (Bloch 1782)

Bouvière



Copyright CSCF, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

Caractères

La bouvière se caractérise par sa petite taille, son corps élevé et sa ligne latérale généralement incomplète. Sa nageoire anale est plus courte que sa dorsale, sa ligne latérale est composée de 5-6 écailles et ses écailles paraissent proportionnellement grandes. Il possède 8-10 rayons rameux (mous) à la nageoire anale.

Taille : 5-6cm

Longévité : 2 à 5 ans

Distribution

La bouvière est une espèce répandue en Europe à partir du nord-est de la France jusqu'aux tributaires de la mer Caspienne à l'est. On peut aussi l'observer dans les affluents de la mer Noire. La Suisse se situe à la marge sud-ouest de son aire de répartition où elle est recensée uniquement dans le bassin du Rhin, dans les lacs et les cours d'eau lents du Plateau. On l'a observée jusqu'à 710m d'altitude. Elle a également été signalée dans le bassin du Rhône (Vieux Rhône, Genève, 2000).

Biologie

La bouvière est un poisson affectionnant les eaux calmes. Son régime est omnivore et il consommera volontiers zoo- et phytoplancton, débris végétaux divers et même de petits organismes benthiques. Son nom latin *amarus* vient du goût de sa chair et le rend donc inintéressant pour la pêche. Le frai a lieu au printemps et suit une méthode aussi extraordinaire qu'étonnante : Le mâle sélectionne un ou plusieurs bivalves et y attire la femelle, celle-ci pond, à l'aide de son ovipositeur (tube de ponte), une petite quantité d'œufs dans les branchies du bivalve qu'elle atteint via le siphon exhalant de celui-ci. Le mâle, une fois la femelle passée, déverse sa semence au-dessus du siphon inhalant du bivalve et c'est ainsi que la fécondation s'opère. Ce mécanisme économise la quantité d'ovule à produire et augmente parallèlement les chances de survie des jeunes grâce à la protection du bivalve.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Fortement menacé / Least concern