


Rutilus pigus (Lacépède 1803)

Pigo (ou Gardon galant)



Copyright CSCF, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

Caractères

Le pigo se caractérise par sa lèvre supérieure proéminente et sa bouche infère. Son corps est comprimé latéralement et il a entre 43 et 49 écailles le long de sa ligne latérale. Sa nageoire dorsale est composée de 10-11 rayons rameux (mous), il a 11-12 rayons rameux à la nageoire anale et provient du sud des Alpes.

Taille : 20-40cm Longévité : 7 à 15 ans

Distribution

Le pigo est une espèce présente qu'au sud des Alpes, confinée au nord de l'Italie et au Tessin. En Suisse, il n'est recensé que dans le bassin du Pô où il fréquente les lacs et les secteurs lents des grands cours d'eau de plaine. Il est recensé jusqu'à 285m d'altitude.

Biologie

Le pigo est une espèce benthique et omnivore dont la biologie n'est pas bien connue. Ses repas sont composés principalement d'invertébrés benthiques et le frai a lieu entre avril et mai où il rejoint les zones peu profondes ou l'embouchure des rivières.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Potentiellement menacé / Least concern