


Rutilus rubilio (Bonaparte 1837)

Triotto (ou Rovella)



Copyright CSCF, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

Caractères

Le triotto se caractérise par ses flancs ornés d'une bande sombre. Sa nageoire anale est dotée de 9-10 rayons rameux (mous), elle est approximativement de la même longueur que la dorsale qui elle possède 8-9 rayons rameux. Sa ligne latérale est composée de 37-42 écailles. Il provient du sud des Alpes.

Taille : 10-15cm Longévité : 4 à 10 ans

Distribution

Le triotto est le cyprinidé le plus commun d'Italie, il est toutefois absent des îles méditerranéennes. Il colonise les affluents de l'Adriatique jusqu'à la péninsule Balkanique. En Suisse, il est recensé exclusivement dans le bassin du Pô où il fréquente les lacs et les secteurs calmes des grands cours d'eau. Il est recensé jusqu'à 470m d'altitude.

Biologie

Le triotto est un poisson grégaire qui fréquente les lacs et les zones calmes des grands cours d'eau riche en végétation. Il est omnivore et sa période de frai a lieu entre avril et juin à faible profondeur où les femelles déposent leurs œufs adhérents sur le substrat. Il se déplace en bancs près des rives et regagnent les profondeurs en hiver.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Potentiellement menacé / Near threatened