


Rutilus rutilus (Linnaeus 1758)

Gardon (ou Vengeron)



Caractères

Copyright CSCE, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

Le gardon se caractérise par ses reflets rougeâtres dans l'œil et sur les nageoires. Il possède 10-11 rayons rameux (mous) sur la nageoire anale et 10-11 à la dorsale. Sa bouche est terminale et il a entre 39 et 44 écailles le long de sa ligne latérale.

Taille : 10-40cm Longévité : 7 à 15 ans

Distribution

Le gardon est très répandu en Europe. De l'Irlande à l'ouest à la rivière de Lena à l'est et de la mer de Kara au nord aux affluents de la mer Caspienne au sud, on le trouve dans presque tous les lacs et les courants lents. On ne le trouve toutefois pas au-delà des Pyrénées ou des Alpes. En Suisse, le gardon est recensé dans les trois bassins principaux (Rhin, Rhône et Pô) dans les lacs et les grands cours d'eau lents du Plateau. Il a été observé jusqu'à 1592m d'altitude dans des lacs de montagne où il a été introduit.

Biologie

Le gardon est une espèce dont la morphologie varie énormément en fonction des apports du milieu dans lequel il se développe. Il affectionne les grands cours d'eau à courant lent ou les lacs. Il se déplace en bancs près des rives et regagne les profondeurs en hiver. Il est omnivore et se nourrit de tout ce qui est susceptible d'être avalé. Le frai a lieu au printemps dans des zones peu profondes et parfois on observe une légère migration de certains individus vers l'amont des rivières. La femelle dépose ses œufs adhérents sur le substrat. Le mâle porte des tubercules nuptiaux.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Non menacé / Least concern