


Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus 1758)

Rotengle



Caractères

Le rotengle se caractérise par ses nageoires pelviennes (ventrales), son anale et sa caudale colorées de rouge vif et ses yeux rouges. Ses nageoires pelviennes sont fixées nettement en avant du bord antérieur de la dorsale, il possède une crête aiguë entre les pelviennes et l'anus. Son corps est ovale et comprimé latéralement et il possède 10-14 rayons rameux (mous) à la nageoire anale. Sa ligne latérale est composée de 39-42 écailles.

Taille : 25-35cm Longévité : 5 à 15 ans

Distribution

Le rotengle est répandu à travers toute l'Europe, du nord des Pyrénées et de l'Italie à la chaîne de l'Oural. Il est absent de Scandinavie, des îles méditerranéennes et du nord de l'Ecosse. En Suisse, il est recensé dans les bassins du Rhin, du Rhône, du Pô et du Danube où il fréquente les lacs et les grands cours d'eau du Plateau. Il est recensé jusqu'à 1850m d'altitude, où il a été introduit dans des lacs de montagne.

Biologie

Le rotengle fréquente les cours d'eau lents du Plateau ainsi que les lacs. Il affectionne les zones riches en végétation. Le frai a lieu entre avril et juin dans des zones peu profondes où la femelle dépose ses ovules rougeâtres et adhérents près des berges directement dans la végétation. Le rotengle est un poisson résistant aux hausses de température ainsi qu'à l'eutrophisation des eaux. Les jeunes se nourrissent de plancton puis passent rapidement à un régime omnivore composé en grande partie de végétaux.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Non menacé / Least concern