


Squalius cephalus (Linnaeus 1758)

Chevaine (ou chevesne)



Copyright CSCF, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

Caractères

Le chevaine se caractérise par ses écailles liserées de noir formant un réseau très net. Sa section de corps est arrondie, ses nageoires sont rougeâtres. Il possède 8-10 rayons rameux (mous) à la nageoire anale et 8-9 à la nageoire dorsale. Le sommet de son anale est convexe et il possède entre 44 et 46 écailles sur sa ligne latérale.

Taille : 40-50cm Longévité : 10 à 22 ans

Distribution

Le chevaine est une espèce largement répandue en Europe dans la zone allant du sud de l'Ecosse et de l'Angleterre jusqu'à l'Oural. Elle est absente d'Irlande, de la partie septentrionale de la Scandinavie et des îles de la Méditerranée. Certains auteurs distinguent différentes sous-espèces, notamment au nord et au sud des Alpes, que nous traiterons indifféremment ici. En Suisse, elle est recensée dans les trois principaux bassins (Rhin, Rhône et Pô) majoritairement dans les cours d'eau moyens à larges et dans les lacs du Plateau et du Tessin. Elle a été observée jusqu'à 1578m d'altitude.

Biologie

Le chevaine est un poisson vivant en grands bancs pour les juvéniles et plutôt solitaire pour les adultes. Il est omnivore au cours des premières années de sa vie et devient un prédateur féroce en vieillissant. Il affectionne les cours d'eau à courant rapide et les lacs également. Le frai a lieu au printemps et le mâle arbore des tubercules nuptiaux. Il féconde des milliers d'ovules adhérents déposés par la femelle sur le substrat. L'éclosion survient environ dix jours plus tard.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Non menacé / Least concern