


Tinca tinca (Linnaeus 1758)

Tanche



Copyright CSCF, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

Caractères

La tanche se caractérise par ses 2 barbillons et sa bouche terminale ornée de lèvres. Son corps est noir-verdâtre ou brun avec des reflets cuivré, sa peau a une texture visqueuse et ses écailles sont petites. Elle a entre 96 et 115 écailles le long de sa ligne latérale, 6-10 rayons rameux (mous) à la nageoire anale et 8-10 à la dorsale.

Taille : 20-30cm Longévité : 3 à 15 ans

Distribution

La tanche est un poisson largement distribué en Europe. Elle est toutefois absente du nord du continent, des affluents sud-est de l'Adriatique et d'Ecosse. En Suisse, elle est recensée dans les bassins du Rhin, du Rhône, du Pô et du Danube et majoritairement dans les lacs et les grands cours d'eau de plaine. Elle a été observée jusqu'à 1652m d'altitude.

Biologie

La tanche est un poisson omnivore qui consomme autant de végétaux que d'organismes benthiques divers. Elle est plutôt sédentaire et tolère des taux en oxygène très bas. Elle s'envase lorsque les conditions sont mauvaises. Elle affectionne les lacs et les cours d'eau de plaine riches en végétation dans laquelle elle fraie lorsque la température de l'eau avoisine les 19-20°C. La femelle y dépose directement ses ovules adhérents. Le mâle se reconnaît à ses nageoires ventrales plus volumineuses et robustes.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Non menacé / Least concern