




	zone à truite supérieure inférieure		zone à ombre	zone à barbeau	zone à brème	zone à grémille-plie
profils						
types du substrat	rocher, grosses pierres, galets		gravier	sable	argile, limon	
turbidité de l'eau	uniquement lors de crues					
température moyenne annuelle	- 24°C en été rarement > 10°C		en été rarement > 15°C	en été souvent > 15°C	en été > 20°C	en été souvent > 20°C
espèces caractéristiques	Truite de rivière Chabot Vairon Loche franche Lamproie de rivière		Ombre Truite de rivière Nase Chevaine Blageon Vandoise (Spirin) (Barbe) (Anguille) Saumon atlantique (Brochet)	Barbe Ombre Nase Chevaine Blageon Vandoise Spirin Gardon Rotengle Anguille (Perche) Saumon atlantique Brochet Silure (Lotte)	Brème franche Carpe Tanche Chevaine Ablette Brème bordelière Barbe Gardon Rotengle Anguille Perche Sandre Brochet Silure Lotte	Grémille Flet Tanche Chevaine Brème franche Carpe Alose feinte Gardon Rotengle Anguille Perche Sandre Brochet Silure Lotte Mulet Esturgeon
nombre total d'espèces	5		env. 12	env. 18	env. 25	env. 38
mode de frai	ponté sur substrat dur					(ponté en eau libre)

Rivière et zonation piscicole
dans

Rubin J-F, 2011. Streams, Ecology of the Fishes of Switzerland part 3, MSc Behaviour Evolution and Conservation (BEC) Courses, UniL, Lausanne