


Anguilla anguilla (Linnaeus 1758)

Anguille commune (ou d'Europe)



Caractères

Copyright CSCF, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

L'anguille possède un corps serpentiforme. Sa nageoire dorsale et sa nageoire anale forment une bande continue. Elle ne possède pas de nageoires pelviennes (ventrales), son ouverture branchiale est petite et située en avant de la pectorale, couverte d'un opercule.

Taille : 40-150cm Longévité : jusqu'à 50 ans

Distribution

L'anguille se distribue sur toutes les côtes européennes y compris dans les habitats dulçaquicoles accessibles depuis les côtes. Sa distribution s'est étendue au cours du temps suite à de nombreux repeuplements. En Suisse, elle est recensée dans les trois bassins principaux (Rhin, Rhône, Pô). On la trouve dans presque tous les types de cours d'eau hormis les ruisseaux et les rivières à fort courant. On la retrouvera de préférence dans les grands cours d'eau du Plateau et dans les grands lacs. Cette espèce est signalée jusqu'à 997m d'altitude dans les lacs de montagne où elle a été introduite.

Biologie

L'anguille est un poisson catadrome passant la majeure partie de sa vie en eau douce. Vers l'âge de 7-18 ans, elle atteint sa maturité sexuelle et cesse de se nourrir. Elle migre alors jusqu'à la mer des Sargasses pour se reproduire. Dès l'éclosion, les larves leptocéphales regagnent les côtes européennes en trois ans environ. Dès lors, elles sont appelées civelles (60-90mm) et colonisent les lacs et rivières d'Europe grâce à leur grande capacité à surmonter les obstacles. Les anguilles sont essentiellement prédatrices (poissons et invertébrés) ou charognardes.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Potentiellement menacé / Critically endangered