


Cobitis taenia (Linnaeus 1758)

Loche de rivière



Copyright CSCF, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

Caractères

La loche de rivière est un poisson de petite taille, à la tête étroite et au corps effilé. On la reconnaît principalement à l'aide des six barbillons courts qu'elle possède autour de la bouche et des deux petits aiguillons sous chaque œil. Les flancs portent un ou deux rangs de taches sombres et rondes, sa bouche est infère et elle possède moins de 10 rayons à la nageoire anale.

Taille : 8-10cm

Longévité : 3 à 5 ans

Distribution

La distribution de la loche de rivière s'étend du Japon au Portugal mais il faut savoir que la taxonomie de cette famille est très complexe et que plusieurs sous-espèces sont certainement regroupées sous le nom de *Cobitis taenia*. En Suisse, elle est recensée dans les bassins versants du Rhin et du Pô. Cette espèce est signalée jusqu'à 1070m d'altitude mais il s'agit d'une exception dans un lac de montagne car la loche est une espèce de Plateau.

Biologie

La loche de rivière est un poisson de fond qui s'enfouit volontiers dans le sédiment sableux durant la journée puis fouille le sable pendant la nuit à la recherche d'organismes benthiques et de déchets organiques. Une respiration accessoire intestinale permet à la loche de survivre en cas de trop faible concentration en oxygène. Le frai a lieu entre avril et juin, la femelle dépose ses ovules sur la végétation et les pierres immergées à faible profondeur. Les larves se déplaceront ensuite vers le fond.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Menacé / Least concern