


Cottus gobio (Linnaeus 1758)

Chabot



Copyright CSCF, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

Caractères

Le chabot se caractérise par sa tête large et aplatie, par ses opercules et ses dorsales munies de rayons épineux. Sa peau est nue, ses nageoires pelviennes (ventrales) sont insérées juste en arrière des pectorales et sont presque blanches.

Taille : 8-12cm

Longévité : 4 à 6 ans

Distribution

Le chabot est une espèce européenne répandue du nord de l'Espagne à l'Oural et de la Scandinavie au nord de l'Italie. Il est absent d'Ecosse, de Norvège, d'Irlande, de la Finlande, du nord de la Suède et du sud de la Grèce. En Suisse, il est recensé dans les trois bassins principaux (Rhin, Rhône et Pô). Il fréquente principalement les petites rivières mais on le trouve aussi dans les lacs et les grands cours d'eau. Le chabot a été observé jusqu'à 2159m d'altitude.

Biologie

Le chabot est un poisson benthique dépourvu de vessie natatoire. Mauvais nageur, il reste caché sous les pierres et chassent divers invertébrés. Il affectionne les cours d'eaux vifs et de bonne qualité, mais aussi les rives caillouteuses des lacs. Le frai a lieu entre février et juin sur le fond sous des pierres, dans des petites niches préparées par le mâle qui surveillera ensuite la ponte jusqu'à éclosion.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Potentiellement menacé / Least concern