


Lepomis gibbosus (Linnaeus 1758)

Perche soleil



LEPOMIS GIBBOSUS
Presence in 5x5 km
1990< 1990



Copyright CSCF, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

Caractères

La perche soleil se reconnaît aisément à l'aide de la forme ronde de son corps, de ses deux nageoires dorsales fusionnées, des trois rayons épineux sur la nageoire anale. On notera aussi sa robe atypique marquée de bandes horizontales sur les opercules et de la présence d'une tache rouge sombre sur l'opercule des mâles. Elle possède moins de 50 écailles sur sa ligne latérale.

Taille : 10-20cm Longévité : 6 à 10 ans

Distribution

La perche soleil est un poisson originaire d'Amérique du Nord qui a été introduit en Europe dans la seconde moitié du 19^{ème} siècle. Actuellement, elle colonise de grands secteurs à l'ouest, au centre et à l'est de l'Europe. En Suisse, cette espèce a été recensée à basse altitude dans les trois bassins principaux (Rhin, Rhône et Pô). L'altitude maximale à laquelle la perche soleil est signalée est de 725m.

Biologie

La perche soleil affectionne les étangs, les lacs et les zones à courant lent des grandes rivières de plaine. On la trouvera dans de l'eau claire et dans la végétation dense des zones littorales. Son régime alimentaire consiste en divers invertébrés aquatiques, têtards, frai de poisson et des jeunes alevins. Le frai a lieu entre mai et juin dans des secteurs où l'eau est relativement chaude. Le mâle, arborant une parure nuptiale, creuse un nid sur fond sableux ou graveleux dans lequel la femelle viendra déposer ses ovules. L'éclosion a lieu quelques jours après et le mâle surveillera les jeunes pendant leur croissance.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Néozone / Not evaluated