



Micropterus dolomieu (Lacépède 1802)

Black bass (ou Achigan) à petite bouche

MICROPTERUS DOLOMIEU
Presence in 5x5 km
1990< ■ ■>=1990



Copyright CSCF, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

Caractères

Le black bass à petite bouche se caractérise, comme l'indique son nom, par sa petite bouche dont la mâchoire supérieure n'atteint que le niveau du milieu de l'œil en comparaison avec l'autre espèce du même genre le black bass à grande bouche. Il possède deux nageoires dorsales dont la première est constituée de courts rayons épineux. On remarquera aussi son corps élevé et la présence de bandes sombres sur ses flancs qui peuvent être absentes. Il possède 69-78 écailles sur sa ligne latérale.

Taille : 20-50cm Longévité : 4 à 7 ans

Distribution

Le black bass à petite bouche est un poisson originaire d'Amérique du Nord et a été introduit en Europe au cours du 19^{ème} siècle. Son aire de distribution européenne est très morcelée. En Suisse il a été recensé une seule fois dans le bassin du Pô dans lequel il aurait été introduit pour la pêche sportive au début du 20^{ème} siècle.

Biologie

Le black bass à petite bouche est un poisson affectionnant les couches supérieures chaudes des lacs et des rivières lentes. Dans un premier temps, il se nourrit de divers macroinvertébrés puis progressivement devient piscivore. Le frai a lieu entre avril et août sur fonds sableux ou graveleux. Le mâle y creuse une dépression dans laquelle la femelle vient déposer ses ovules. Le mâle surveillera les œufs jusqu'à éclosion.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Néozone / Not evaluated