


Micropterus salmoides (Lacépède 1802)

Black bass (ou Achigan) à grande bouche



Caractères

Le black bass à grande bouche se caractérise, comme l'indique son nom, par sa grande bouche dont la mâchoire supérieure dépasse le niveau du bord postérieur de l'œil. Il possède deux nageoires dorsales dont la première est constituée de courts rayons épineux. On remarquera aussi son corps élevé et la présence de taches sombres sur sa robe formant une bande plus ou moins discontinue sur ses flancs. Son opercule est triangulaire et il possède 63-69 écailles sur sa ligne latérale.

Taille : 40-60cm Longévité : 4 à 7 ans

Distribution

Le black bass à grande bouche est un poisson originaire d'Amérique du Nord et a été introduit en Europe au cours du 19^{ème} siècle. Son aire de distribution européenne est très morcelée. En Suisse, il a été recensé dans le bassin du Rhin et dans celui du Pô dans lesquels il aurait été introduit pour la pêche sportive au début du 20^{ème} siècle. L'altitude maximale d'observation est 512m.

Biologie

Le black bass à grande bouche est un poisson affectionnant les couches supérieures chaudes des lacs et des rivières lentes. Dans un premier temps, il se nourrit de divers macroinvertébrés puis progressivement devient piscivore. Le frai a lieu entre mars et juillet sur fonds sableux ou graveleux. Le mâle y creuse une dépression pouvant parfois atteindre un mètre de profondeur dans laquelle la femelle vient déposer ses ovules. Le mâle surveillera les œufs jusqu'à éclosion.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Néozone / Not evaluated