


Salmo trutta morpha *fario* (Linnaeus 1758)

Truite de rivière



Copyright CSCE, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

Caractères

La truite de rivière est un poisson de la famille des salmonidés que l'on distingue grâce à la présence d'une nageoire adipeuse en retrait de sa dorsale, à la présence de petites taches rouges arrondies et cernées de clair et à la présence de taches noires plus irrégulières.

Taille : 10-25cm Longévité : 3 à 7 ans

Distribution

La truite de rivière est une espèce largement répandue à travers toute l'Europe, l'Asie Mineure et l'Afrique du nord. Depuis 1883, elle a été introduite en Amérique du nord puis du sud, au sud de l'Afrique, en Australie et en Nouvelle-Zélande. En Suisse, elle est l'espèce la plus largement répandue. Elle colonise essentiellement les cours d'eau rapides mais on peut la trouver aussi dans des cours d'eau plus lent et aux embouchures des lacs. Cette espèce est signalée jusqu'à 2823m d'altitude.

Biologie

La truite de rivière est un poisson d'eau fraîche et oxygénée et donne ainsi son nom à la partie amont des rivières, la zone à truites. Cette espèce possède un fort polymorphisme en fonction des conditions du milieu. Elle peut atteindre 50cm dans une rivière de plaine mais ne peut pas dépasser 25cm dans les torrents de montagne. Le frai a lieu d'octobre à janvier et provoque une petite migration vers l'amont afin d'enfouir les ovules dans un substrat graveleux bien oxygéné. Les embryons éclosent après 6 à 12 semaines environ puis restent enfouis dans le substrat environ 3 semaines durant lesquelles ils se nourrissent en résorbant leur vésicule vitelline. Adulte, la truite est un carnivore non spécialisé qui ingurgite tout ce qu'il y a à disposition (invertébrés ou vertébrés).

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Potentiellement menacé / Least concern (*Salmo trutta*)