


Salmo trutta morpha lacustris (Linnaeus 1758)

Truite de lac (ou lacustre)



Caractères

Copyright CSCF, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

La truite de lac est un poisson de la famille des salmonidés que l'on distingue grâce à la présence d'une nageoire adipeuse en retrait de sa dorsale et à la présence de petites taches noires clairsemées en formes d'étoiles ou de caractères typographiques. Sa robe est majoritairement argentée et dépourvue de taches rouges.

Taille : 25-100cm Longévité : 4 à 7 ans

Distribution

La truite de lac est une espèce répandue au centre et au nord de l'Europe, en Scandinavie, en Grande-Bretagne, en Islande et a été introduite en Amérique du nord. En Suisse, elle est répandue mais pas aussi largement que la truite de rivière. Ses exigences écologiques la confinent dans les lacs des Alpes et des Préalpes, dans les lacs subjurassiens et tessinois, ainsi que dans tous leurs affluents. Cette espèce est signalée jusqu'à 2579m d'altitude.

Biologie

La truite de lac est un poisson d'eau fraîche et oxygénée, il est donc typique des régions montagneuses et sub-montagneuses. Le frai a lieu d'octobre à décembre et provoque une migration vers l'amont afin d'enfouir les ovules dans un substrat graveleux bien oxygéné. Les adultes attendent les crues automnales afin de remonter le plus haut possible pour se reproduire. Les jeunes se nourrissent principalement d'organismes benthiques mais aussi de quelques insectes volants. Adulte, la truite est un carnivore non spécialisé qui ingurgite tout ce qu'il y a à disposition (invertébrés ou vertébrés), principalement du poisson. Les jeunes truitelles restent 1 à 3 ans dans les rivières puis redescendent dans les lacs.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Fortement menacé / Least concern (*Salmo trutta*)