


Salvelinus alpinus (Linnaeus 1758)

Omble chevalier



Caractères

L'omble chevalier se distingue par la présence d'un liseré blanc sur le bord antérieur des nageoires paires et de la nageoire anale. Durant la période de reproduction (novembre-janvier), son ventre et les nageoires apparaissent rouge sang surtout chez le mâle. Ses écailles sont très petites et il y en a entre 190 et 240 le long de sa ligne latérale. Ses flancs bleu-gris ou verdâtres sont marqués de petites taches jaunes, oranges ou rouges.

Taille : 15-50cm Longévité : 8 à 12 ans

Distribution

La distribution de l'omble chevalier est très nordique. Il est largement répandu dans les régions septentrionales de l'hémisphère nord. Les populations d'Europe centrale sont considérées comme des reliques de l'époque glaciaire car isolées du reste de l'aire de répartition. En Suisse, il a été recensé dans les quatre principaux bassins (Rhin, Rhône, Pô et Danube) et on le trouve également dans certains lacs de montagne jusqu'à 2790m d'altitude dans lesquels il a été introduit.

Biologie

L'omble chevalier est une espèce d'eau froide et lacustre. Au contraire de la forme nordique qui est migratrice, la forme d'Europe centrale est sédentaire et présente un fort polymorphisme de taille. La reproduction a lieu entre novembre et janvier dans des frayères, généralement formées d'éboulis subaquatiques ou de graviers propres, que l'on nomme omblières et sur lesquelles la femelle dépose ses œufs qui s'y développeront. Les jeunes sont, dans un premier temps, nourris passivement par leur vésicule puis planctophages et deviennent carnassiers en grandissant.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Menacé / Least concern