


Salvelinus fontinalis (Mitchill 1814)

Saumon (ou Omble) de fontaine



Copyright CSCF, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

Caractères

Le saumon de fontaine se distingue par ses nageoires paires et son anale orangées avec une double bande blanche et noire, ses nageoires dorsale et caudale tachetées, sa marbrure dorsale et ses flancs bleutés portant de petites taches rougeâtres. De plus, on notera qu'il a une très grande fente buccale. Durant la période de reproduction (octobre-février) sa robe apparaît beaucoup plus vive.

Taille : 20-45cm Longévité : 4 à 5 ans

Distribution

Le saumon de fontaine est une espèce introduite en Suisse vers 1880. Cette espèce est originaire d'Amérique du Nord et a été largement introduite en Nouvelle-Zélande, en Asie et en Europe pour sa haute valeur économique. En Suisse, il a été recensé dans quatre bassins (Rhin, Rhône, Pô et Adige) et jusqu'à 2686m d'altitude.

Biologie

Le saumon de fontaine est une espèce d'eau froide se reproduisant dans des sites similaires à la même période que la truite de rivière. Son intérêt économique vient du fait qu'elle est beaucoup plus tolérante aux faibles taux d'oxygène et à l'acidité de l'eau que la truite. Elle apprécie les courants vifs et rapides de certains secteurs de cours d'eau. Elle est un carnivore vorace qui déguste tout ce qui bouge : amphibiens, reptiles et autre poissons, même ses congénères.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Néozone / Not evaluated