


Salvelinus namaycush (Walbaum 1792)

Truite des lacs canadiens (ou Cristivomer ou Omble du Canada)



Copyright CSCF, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

Caractères

La truite des lacs canadiens se distingue par sa robe de couleur grise présentant des taches hiéroglyphiques et/ou ovales irrégulières. Sa grande bouche est armée de fortes dents et ses nageoires présentent une bande blanche.

Taille : 45-90cm Longévité : 4 à 5 ans

Distribution

La truite des lacs canadiens est un poisson originaire de l'Alaska, du Canada et du nord des États du nord des USA. Le sud de son aire naturelle de distribution s'étend jusqu'à limite des anciennes glaciations. Elle a été largement introduite dès le milieu du 19^{ème} siècle en Amérique du Sud, en Nouvelle-Zélande et pour l'Europe, en Scandinavie ainsi que dans les régions alpines. En Suisse, elle est recensée dans les cinq bassins versants, Rhin, Rhône, Pô, Danube et Adige. Cette espèce est signalée jusqu'à 2834m d'altitude mais exclusivement dans des lacs.

Biologie

Les exigences écologiques particulières de la truite des lacs canadiens et sa croissance élevée en ont fait un poisson économiquement intéressant sachant qu'il s'adaptait à des conditions jugées extrêmes pour d'autres espèces. C'est pour cette raison que l'on retrouve cette espèce en Suisse, principalement dans des lacs de haute altitude. La truite des lacs canadiens se nourrit principalement de macroinvertébrés au stade juvénile, puis passe ensuite à un régime principalement piscivore au stade adulte. La reproduction a lieu de septembre à novembre sur des fonds pierreux ou graveleux.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Néozone / Not evaluated