


Sander lucioperca (Linnaeus 1758)

Sandre



Copyright CSCF, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

Caractères

Le sandre se caractérise par la présence de bandes verticales sombres diffuses sur ses flancs, par sa forte dentition et son opercule dépourvu d'épines. On remarquera aussi sa 1^{ère} nageoire dorsale épineuse comportant 13 à 15 rayons épineux et marquée de points foncés et sa 2^{ème} dorsale avec plus de 17 rayons rameux (mous).

Taille : 20-50cm Longévité : 6 à 20 ans

Distribution

En Europe sa répartition naturelle va du Caucase à la Scandinavie méridionale ainsi qu'à la Finlande du nord. Il a été introduit vers 1880 dans le bassin du Rhin puis dans différents sites plus à l'ouest, d'où il s'étend actuellement. En Suisse, il a maintenant colonisé le bassin du Pô en plus de celui du Rhin. Il fréquente les lacs et les grands cours d'eau du Plateau. Il a été signalé jusqu'à 900m d'altitude suite à son introduction dans divers lacs de moyenne altitude.

Biologie

Le sandre est une espèce tolérante appréciant les milieux eutrophes pour autant que les eaux soit suffisamment oxygénées. Il est un prédateur nocturne redoutable qui s'attaque aux jeunes d'autres espèces de poissons. L'occurrence de cannibalisme chez cette espèce est confirmée. Le frai a lieu entre avril et juin en eaux peu profondes. La femelle dépose ses ovules sous forme de chaînes sur divers supports. Le mâle garde puis ventile la ponte jusqu'à éclosion.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Néozone / Least concern