


Zingel asper (Linnaeus 1758)

Apron (ou Apron du Rhône)



ZINGEL ASPER
Presence in 5x5 km
1990< ■ ■>1990



Caractères

Copyright CSCF, 31.12.2011, Base cartographique: OFS, OFT

L'apron se caractérise principalement par son corps élancé, ses deux nageoires dorsales nettement séparées, ses yeux presque sur le haut du crâne puis ses trois à cinq bandes qui encerclent le corps. On remarquera aussi qu'il possède des épines sur les opercules, une bouche infère et moins de 17 rayons rameux (mous) à la 2^{ème} nageoire dorsale.

Taille : 10-20cm Longévité : 1 à 3.5 ans

Distribution

L'apron est une espèce relique de l'époque danubienne. Son ancienne répartition (vers 1900) s'étendait du Doubs jusque dans le Rhône et presque dans tout son bassin. Actuellement, cette espèce a nettement régressé et n'occupe qu'environ 17% de son aire de répartition originelle (colonisée). En Suisse, l'apron est signalé exclusivement dans le bassin du Doubs avec une altitude maximale de recensement de 476m. Il s'agit donc d'une espèce naturellement très rare car elle n'est présente que dans ce cours d'eau.

Biologie

L'apron est un poisson de rivière qui est sédentaire et solitaire. Il est actif principalement de nuit où il chasse essentiellement des macroinvertébrés benthiques. Le frai a lieu au printemps et les ovules, adhérents et peu nombreux, sont cachés dans le sédiment où ils se développeront pendant 30 à 40 jours. Une fois éclos, les alevins remontent vers la surface où ils se nourriront principalement de zooplancton. Après une cinquantaine de jours, les petits poissons acquièrent alors la morphologie de leurs parents puis descendent vers le fond pour y adopter leur régime définitif.

Statut en Suisse / Statut IUCN (international)

Menacé d'extinction / Critically endangered