

Espèce	Demande de validation						Exigences						Détermination	Remarques	Confusion	Difficulté
	JU	PL	NA	AIW	AIO	SA	JU	PL	NA	AIW	AIO	SA				
Aeshna affinis Vander Linden, 1820	1	3	1	1		2	p,d	d	p,d	p,d		p,d	vue rapprochée	capture recommandée	Anax imperator, Aeshna mixta	2
Aeshna caerulea (Ström, 1783)			3	3	3	3			d	d	d	d	vue rapprochée	capture recommandée	autres espèces genre Aeshna	2
Aeshna cyanea (Müller, 1764)	*	*	*	*	*	*							vue rapprochée			2
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)	*	*	*	3	3	1				d	d	p,d	vue		A. isoceles	1
Aeshna isoceles (Müller, 1767)	1	*	*	*	*	3	p,d					d	vue		A. grandis	1
Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)	*	*	*	*	*	*							vue rapprochée	capture recommandée	A. mixta, A. subarctica	2
Aeshna mixta Latreille, 1805	3	*	*	*	1	*	p,d				p,d		vue rapprochée	capture recommandée	A. juncea	2
Aeshna subarctica elisabethae Djakonov, 1922	2		2		2		p,c		p		p		main		A juncea	3
Anax ephippiger (Burmeister, 1839)	1	1	1	1		1	p,d	p,d	p,d	p,d			vue rapprochée	à la jumelle (capture souvent difficile)	A. parthenope	2/3
Anax imperator Leach, 1815	*	*	*	*	*	*							vue		A. parthenope ♀	2
Anax parthenope Sélys, 1839	3	*	3	3		3	d		d	d		d	vue rapprochée	à la jumelle (capture souvent difficile)	A. imperator ♀, A. ephippiger ♂	2
Boyeria irene (Fonscolombe, 1838)		2	3			1		p,d	p,d			p,c	vue rapprochée	capture recommandée	Aeshna cyanea ♀	2
Brachytron pratense (Müller, 1764)	1	*	*	1			p,d		p,d				vue rapprochée	capture recommandée	Aeshna cyanea	2
Calopteryx splendens caprai Conci, 1956						3						p,c	vue rapprochée		C. s. splendens	3
Calopteryx splendens splendens (Harris, 1782)	*	*	*	*	3							p,c	vue rapprochée		C. splendens caprai	2
Calopteryx virgo meridionalis Sélys, 1873						3						p,c	main		C. v. virgo	3
Calopteryx virgo virgo (Linnaeus, 1758)	*	*	*	*	3	3						p,c	main		C. virgo meridionalis	2
Ceriagrion tenellum (De Villers, 1789)	2	2	2		2		p,d	p,d	p,d				vue rapprochée		Pyrrhosoma nymphula	2
Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)	3	2	*	*	*	1	d	p,c				p,c	vue rapprochée	capture recommandée	Enallagma cyathigerum	2/3
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840)		+						c					main		C. hastulatum	2/3
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	2	2	2	+	1	+	p	p	p	c	p,c	c	main		C. ornatum	2/3
Coenagrion ornatum (Sélys, 1850)	+	+				*	c	c					main		C. mercuriale	2/3
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)	*	*	*	*	*	*							vue rapprochée	capture recommandée	C. pulchellum	2/3
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)	3	*	*	2	1	2	p,c		p,d	p,c	p,d		vue rapprochée	capture recommandée	C. puella	2/3
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)	2	2	2				p,c	p,c	p,c				main		C. pulchellum	2/3
Cordulegaster bidentata Sélys, 1843	*	*	*	*	3	*						p,d	vue rapprochée	capture recommandée	C. boltonii	2
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)	*	*	*	2	2	*				p,d			vue rapprochée	capture recommandée	C. bidentata	2
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)	*	*	*	*	3	3					p,d	p,d	main		Somatochlora metallica	2
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)	*	*	*	*	3	*						d	vue rapprochée		Sympetrum fonscolombii	2
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)	*	*	*	*	*	*							vue rapprochée		Coenagrion hastulatum	2
Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825)	2	2	2	+			p,d	p,d	p,d	p,c			vue rapprochée	à la jumelle (capture souvent difficile)	Libellula quadrimaculata	2
Erythromma lindenii (Sélys, 1840)	*	*	3	*	1	3				d	p,d	d	vue rapprochée	à la jumelle (capture souvent difficile)	Coenagrionidae	2
Erythromma najas (Hansemann, 1823)	*	*	*	2	1	1				p,c	p,c	p,c	vue rapprochée	à la jumelle (capture souvent difficile)	E. viridulum	2
Erythromma viridulum Charpentier, 1840	*	*	*	*	1	*						p,c	vue rapprochée	à la jumelle (capture souvent difficile)	E. najas	2
Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)		1							p,c				main		autres espèces genre Gomphus	2
Gomphus pulchellus Sélys, 1840	*	*	2	+					p,d	c			vue rapprochée		autres espèces genre Gomphus	2
Gomphus simillimus Sélys, 1840		2							p				main		autres espèces genre Gomphus	2
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)	3	*	3		2		p,d		p,d			p	vue rapprochée		autres espèces genre Gomphus	2
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)	*	*	*	*	*	*							vue rapprochée			2
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)	*	*	*	*	*	*							vue rapprochée	capture recommandée	I. elegans	2/3
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)	3	3	3		3		p	p	p		p		main		autres espèces genre Lestes	2
Lestes dryas Kirky, 1890	2	2	2	2	2		p,c	p,c	p,c	p,c	p,c		main		L. sponsa	2/3
Lestes sponsa (Hansemann, 1823)	*	*	*	*	*	*							main		L. dryas	2/3
Lestes virens vestalis Rambur, 1842	1	2	2		1		c	p,c	p,c			c	main		L. sponsa, L. viridis	2/3
Lestes viridis (Vander Linden, 1825)	*	*	*	*	2	*						p,d	main			2
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)	+	2	1	2			c	p,c	c	p,c			vue rapprochée		L. caudalis ♀	2
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840)	*	2		*	*	*				p,c			vue rapprochée		L. albifrons ♀	2
Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825)	*	*	*	*	*	*							vue rapprochée		L. rubicunda	2
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)	1	2	2				p	p,d	p,d				vue rapprochée			2
Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758)	*	1		*	*	*				c			main		L. dubia	3
Libellula depressa Linnaeus, 1758	*	*	*	*	*	*							vue			1
Libellula fulva Müller, 1764	2	*	*	2	2		p,d			p,d		p,d	vue			1
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758	*	*	*	*	*	*							vue			1
Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840)		2						p,c					main			2

Espèce	Demande de validation						Exigences						Détermination	Remarques	Confusion	Difficulté
	JU	PL	NA	AIW	AIO	SA	JU	PL	NA	AIW	AIO	SA				
Onychogomphus f. forcipatus (Linnaeus, 1758)	3	3	3	1			p	p	p	p,c			main		O. forcipatus unguiculatus	2
Onychogomphus forcipatus unguiculatus (Vander Linden, 1820)						3						p,d	main		O. f. forcipatus	2
Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840)		+						p,c					main		O. forcipatus	2
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758)	1	*	3				p,c		p,d				vue rapprochée			2
Orthetrum albistylum (Sélys, 1848)	3	3	2	1	1	2	p,d		p,d	p,c	p,c	p,d	vue rapprochée		O. cancellatum	2
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)	3	*	3	1	1	3	p,d		p,d	p	p		vue rapprochée	capture recommandée	O. coerulescens	2
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)	*	*	*	*	*	*							vue rapprochée		O. albistylum	2
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)	2	3	3	2	3	3	p,d	p,d	p,d	p,d	p,d	p,d	vue rapprochée	capture recommandée	O. brunneum	2
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)		+				3		c				d	vue rapprochée			2
Platynemesis pennipes (Pallas, 1771)	*	*	*	*	*	*							vue rapprochée			2
Pyrrosoma nymphula (Sulzer, 1776)	*	*	*	*	*	*							vue rapprochée			2
Somatochlora alpestris (Sélys, 1840)	+	+	*	*	*	*	c	c					main		S. arctica	2
Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840)	2	2	2	2	2	2	p,d	p,d	p,d	p,d	p,d	p,d	main		S. alpestris, S. flavomaculata	2
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)	2	*	*	2	1	*	p,d			p,d	p,d		main		S. arctica	2
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)	*	*	*	2	*	*				p,d			main		Cordulia aenea	2
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)	*	*	*	*	*	*							main		S. paedisca	2
Sympecma paedisca Brauer, 1877		2		2				p,c		p,c			main		S. fusca	2
Sympetrum danae (Sulzer, 1776)	*	*	*	*	*	*							vue			1
Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1841)	1	3	2	2	1	1	p,c	p,d	p,d	p,c	p,c		main		S. sanguineum	2
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)	3	3	3	+	3	1	d	d	d	p,c	d	p,c	vue rapprochée		S. sanguineum	2
Sympetrum fonscolombii (Sélys, 1840)	*	*	*	*	*	*							vue rapprochée		Crocothemis erythraea	2
Sympetrum meridionale (Sélys, 1841)	3	3	3	1	1	1	p,d	p,d	p,d	p,c	p,c	p,c	main		S. vulgatum	2
Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766)	3	3	3	+	3	+	d	d	d	p	d	p	vue			1
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)	*	*	*	*	*	*							vue rapprochée		S. depressiusculum	2
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)	*	*	*	*	*	*							vue rapprochée	capture recommandée	S. vulgatum	2
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)	*	*	*	*	*	*							vue rapprochée	capture recommandée	S. striolatum	2

JU = Jura, PL = Plateau, NA = Versant nord des Alpes, AIW = Alpes internes occidentales, AIO = Alpes internes orientales, SA = Versant sud des Alpes

Toutes les espèces non signalées à ce jour de Suisse sont bien évidemment soumises à validation

Demande de validation

- 1: systématique
- 2: pour sites / régions nouveaux (y. c. redécouverte)
- 3: demande ponctuelle

Pour les espèces non encore observées dans une région biogéographique ou considérées comme disparues (+), validation systématique (1) avec exigence la plus élevée

L'absence de chiffre dans une colonne n'empêche pas qu'une demande soit néanmoins faite pour la région biogéographique correspondante, dans des cas particuliers (localisation aberrante, marginale, etc.)

Exigences

c: collection (1 individu, mâle si possible)*

p: photo (avec vue des critères différentiels)*

d: observation et si besoin description des critères différentiels

* Pour les espèces très localisées, 1 preuve (p ou c) est demandée par (nouveau) site (pas pour chaque observation), pour les autres, au moins 1 preuve (p ou c) par région biogéographique et par observateur, + 1 preuve par "sous-région" où aucune observation récente n'est mentionnée

Méthode de détermination

Main: individu capturé, en main

Vue: détermination à vue, sans capture

Vue rapprochée: à vue de près ou avec jumelles (critères différentiels bien visibles)

Difficulté de détermination

- 1: pas de difficulté particulière
- 2: difficulté moyenne, récolte / photo d'un individu recommandée pour débutants
- 3: examen attentif nécessaire sur le terrain critères difficiles (génitalia, etc.), récolte / photo d'un individu recommandée

Dans certains cas, pas de demandes de validation ou validation simplifiée:

- si les renseignements et documents fournis directement avec la donnée suffisent (photos, mode de détermination, attention particulière apportée à l'observation, etc.)

- en fonction de l'expérience de l'observateur (validation simplifiée)